Πίνακας 2. Διαγνωστική προσπέλαση λοιμώδους διάρροιας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Διάρκεια συμπτωμάτων (>24 ώρες)
Σοβαρότητα συμπτωμάτων
Παρουσία φλεγμονής (πυρετός, αιματηρές κενώσεις, τεινεσμός), συνυπάρχοντα νοσήματα, ανοσοκαταστολή

↓

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επιδημιολογικά: Ύποπτη τροφή, ταξίδι, συνυπάρχοντα νοσήματα, επιδημίες, εποχή του χρόνου κ.λπ.
Κλινικά: Αιματηρές κενώσεις, κοιλιακά άλγη, δυσεντερία, αφυδάτωση, συστηματική τοξικότητα

↓

Ανάλυση δείγματος κοπράνων (μικροσκοπική εξέταση, λακτοφερρίνη κοπράνων αν είναι διαθέσιμη, καλλιέργειες κοπράνων) σε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ διαρροϊκού συνδρόμου με:
• επιμονή άνω των 24 ωρών
• έντονη κλινική συμπτωματολογία
• αιματηρές κενώσεις
• συμπτώματα δυσεντερίας
• υποψία επιδημίας

Διάρροια της κοινότητας ή ταξιδιωτών	Νοσοκομειακή	Επιμένουσα	Ανοσοκαταστολή/ ΣΕΑΑ
Έλεγχος για salmonella, shigella, campylobacter ± *E. coli* 0157-H7 (αν αιματηρή διάρροια ή αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο) ± τοξίνες *clostridium difficile* A και B (αν πρόσφατη αντιμικροβιακή θεραπεία, χημειοθεραπεία, παραμονή σε νοσοκομείο)	τοξίνες *clostridium difficile* A και B ± έλεγχος για salmonella, shigella, campylobacter (σε υποψία επιδημίας, σε ασθενείς >65 ετών με συνυπάρχοντα νοσήματα, ουδετεροπενία, ανοσοκαταστολή ή σε υποψία συστηματικής εντερικής λοίμωξης) ± *E. coli* 0157-H7 (αν αιματηρή διάρροια)	Έλεγχος για πρωτόζωα: *Giardia*, κρυπτοσπορίδιο, *cyclospora, isospora belli* ± Ενδοσκοπικός έλεγχος κατωτέρου πεπτικού	Περαιτέρω έλεγχος για: μικροσπορίδιο, *Mycobacterium avium*, (MAC), κυτταρομεγαλοϊό