

Πίνακας 4. Εκτίμηση και προσέγγιση οξέων διαρροϊκών συνδρόμων που εμφανίζονται εκτός νοσοκομείου.

Συμπτωματική θεραπεία (ενυδάτωση, τροποποίηση της διατροφής)



Σοβαρά συμπτώματα (αφυδάτωση, αιματηρές κενώσεις, πυρετός, διάρκεια >48 ώρες, σοβαρό κοιλιακό άλγος σε ασθενείς >50 ετών, ασθενείς >70 ετών, ανοσοκατασταλμένοι)

↓ Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν

Εξέταση κοπράνων για φλεγμονώδη κύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια)



Απουσία φλεγμονωδών κυττάρων

Norwalk, Rotavirus, C. perfringens, S. aureus, B. cereus, Giardia lamblia, φάρμακα, ΙΦΝΕ σε μερικές περιπτώσεις

↓
Συμπτωματική θεραπεία

Παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων

Campylobacter, Shigella, Salmonella, Enterohemorrhagic E. coli, C. difficile

↓
Συνήθης καλλιέργεια κοπράνων
Επιλεγμένη καλλιέργεια ή
παρασιτολογική κοπράνων σε
επιλεγμένες περιπτώσεις.
Ανίχνευση *C. difficile* σε πρόσφατη λήψη
αντιβιοτικών

↓
Περαιτέρω διερεύνηση εφόσον τα
συμπτώματα επιμένουν

Εμπειρική θεραπεία ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των καλλιεργειών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πυρετός ή αιματηρή διάρροια
- ≥ 8 κενώσεις την ημέρα
- Αφυδάτωση
- Συμπτώματα που διαρκούν >1 εβδομάδα
- Ανάγκη νοσηλείας
- Ανοσοκατασταλμένοι

↓
Αιτιολογική θεραπεία, ανάλογα με το
απομονωθέν αίτιο